

# ПРИВИВКИ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ

## Руководство для родителей Эти прививки нужны вашему ребенку!

При рождении	НерВ
2 месяца	НерВ <sup>1</sup> + DTaP + PCV13 + Hib + Polio + RV
4 месяца	НерВ <sup>2</sup> + DTaP + PCV13 + Hib + Polio + RV
6 месяцев	НерВ <sup>3</sup> + DTaP + PCV13 + Hib <sup>3</sup> + Polio + RV <sup>4</sup> + Influenza <sup>5</sup>
12 месяцев и старше	MMR + DTaP + PCV13 + Hib + Chickenpox + HepA <sup>6</sup> + Influenza <sup>5</sup>

Узнайте у своего врача или медсестры, получает ли ваш ребенок все прививки по графику. Часто прививки комбинируются, чтобы сократить количество инъекций. Обязательно попросите карту прививок с датами введения вакцин вашему ребенку; приносите ее с собой каждый раз при посещении врача.

Ниже представлен список болезней, от которых будет защищен ваш малыш:

**НерВ:** гепатит В, серьезное заболевание печени

**DTaP:** дифтерия, столбняк (тризм челюсти) и коклюш

**PCV13:** пневмококковая конъюгированная вакцина защищает от серьезной инфекции крови, легких и мозга

**Hib:** гемофильная инфекция, тип b, серьезная инфекция мозга, горла и крови

**Polio:** полиомиелит, серьезное заболевание, вызывающее паралич

**RV:** ротавирусная инфекция, серьезное заболевание, вызывающее понос

**Influenza:** серьезная легочная инфекция

**MMR:** корь, свинка и краснуха

**HepA:** гепатит А, серьезное заболевание печени

**Chickenpox:** ветряная оспа

Примечания к таблице:

1. Это возрастной диапазон для данной прививки.
2. Возможно, вашему ребенку не надо вводить вакцину Нер В в возрасте 4 месяцев – это зависит от используемой вакцины. Уточните у своего врача или медсестры.
3. Возможно, вашему ребенку не надо вводить вакцину Hib в возрасте 6 месяцев – это зависит от используемой вакцины. Уточните у своего врача или медсестры.
4. Возможно, вашему ребенку не надо вводить вакцину RV в возрасте 6 месяцев – это зависит от используемой вакцины. Уточните у своего врача или медсестры.
5. Все дети в возрасте от 6 месяцев и старше должны ежегодно проходить вакцинацию от гриппа (influenza) осенью и весной.
6. Возможно, вашему ребенку понадобится ввести 2 дозы вакцины HepA с минимальным промежутком 6 месяцев.