

아기에 대한 예방접종

부모님을 위한 가이드
아기는 다음과 같은 예방접종을 받아야 합니다.

출생 시	**HepB**
2개월	**HepB** 1 - 2개월 [1] + **DTaP** + **PCV** + **Hib** + **Polio** + **RV**
4개월	**HepB**[2] + **DTaP** + **PCV** + **Hib** + **Polio** + **RV**
6개월	**HepB** 6 - 18개월[1] + **DTaP** + **PCV** + **Hib**[3] + **Polio** 6 - 18개월[1] + **RV**[4] + **Influenza**[5]
12개월 이상	**MMR** 12 - 15개월[1] + **DTaP** 15 - 18개월[1] + **PCV** 12 - 15개월[1] + **Hib** 12 - 15개월[1] + **Chickenpox** 12 - 15개월[1] + **HepA**[6] 12 - 23개월[1] + **Influenza**[5]

담당 의사 또는 간호사에게 아기가 스케줄에 따라 모든 예방접종을 받고 있는지 확인하십시오. 백신은 주사 횟수를 줄이기 위해 혼합하여 접종하는 경우가 많습니다. 반드시 아기의 예방접종 날짜가 적힌 기록 카드를 받고 매번 병원에 갈 때마다 이 카드를 가지고 가십시오.

다음은 백신을 접종하여 예방할 수 있는 질병의 리스트입니다.

HepB: B형 간염, 심한 간 질환

DTaP: 디프테리아, 파상풍(입을 열기가 어려움), 백일해(쌕쌕거리는 기침)

PCV: 폐렴구균 결합 백신, 이 백신은 심한 혈액, 폐, 뇌의 감염을 예방합니다.

Hib: b형 독감, 심한 뇌, 목, 혈액의 감염

Polio: 소아마비, 신체가 심하게 마비되는 병

RV: 로타바이러스 감염, 설사를 심하게 하는 병

Influenza: 독감, 심한 폐의 감염

MMR: 홍역, 볼거리, 풍진

HepA: A형 간염, 심한 간 질환

Chickenpox: 수두, varicella라고도 함

위의 도표에 대한 각주:

1. 이것은 이 백신을 접종해야 하는 연령 범위입니다.
2. 사용하는 백신에 따라, 아기가 4개월이 되었을 때 1회분의 Hep B 백신을 접종 받을 필요가 없을 수도 있습니다. 담당 의사나 간호사에게 확인하십시오.
3. 사용하는 백신에 따라, 아기가 6개월이 되었을 때 1회분의 Hib 백신을 접종 받을 필요가 없을 수도 있습니다. 담당 의사나 간호사에게 확인하십시오.
4. 사용하는 백신에 따라, 아기가 6개월이 되었을 때 1회분의 RV 백신을 접종 받을 필요가 없을 수도 있습니다. 담당 의사나 간호사에게 확인하십시오.
5. 6개월 이상 된 모든 자녀는 매년 가을 또는 겨울에 독감 백신을 접종 받아야 합니다.
6. 자녀들은 6개월 이상의 간격을 두고 2회분의 백신을 접종 받아야 합니다.

Translation by Transcend, Davis, CA

www.immunize.org/catg.d/p4010-09.pdf • Item #P4010-09 Korean (10/08)