



**Las vacunas pueden doler un poco...
¡pero las enfermedades pueden doler mucho!**

Llame inmediatamente a su médico o al departamento de emergencia más cercano si contesta "sí" a cualquiera de las siguientes preguntas:

- ¿Tiene su hijo una temperatura a la que debe prestar atención, según lo que le dijo su profesional de la salud?
- ¿Está su hijo pálido o sin fuerzas?
- ¿Ha estado su hijo llorando por más de 3 horas y no deja de llorar?
- ¿Tiene su hijo un llanto extraño y agudo que no es normal?
- ¿Está el cuerpo de su hijo tembloroso, agitado o dando sacudidas?
- ¿Está su hijo notablemente menos activo o alerta?

Después de las vacunas . . .

Qué hacer si su hijo siente molestias

Es posible que su hijo necesite más amor y atención después de que lo vacunen. Muchas de las vacunas que protegen a los niños contra enfermedades serias también pueden causar molestias por un tiempo. Estas son respuestas a las preguntas que muchos padres pueden tener sobre las molestias, fiebre o dolor que puedan sentir los niños después de ser vacunados.

Mi hijo ha estado molesto desde que lo vacunaron. ¿Qué debo hacer?

Es posible que los niños estén molestos después de que los vacunen porque tienen dolor o fiebre. Siga las instrucciones de su profesional de la salud cuando le dé medicamentos para reducir el dolor o bajar la fiebre. **No le dé aspirina.** Si el niño está molesto por más de 24 horas, llame a su médico o al departamento de emergencia del hospital más cercano.

Mi hijo tiene la pierna o el brazo hinchado, caliente y rojo. ¿Qué debo hacer?

Hay varias cosas que puede hacer para ayudar a que su hijo esté más cómodo.

- Póngale un paño húmedo limpio y fresco en la parte adolorida, según sea necesario para que se sienta más cómodo.
- Si después de 24 horas hay más enrojecimiento o dolor, llame a su médico o al departamento de emergencia del hospital más cercano.
- Siga las instrucciones de su profesional de la salud cuando le dé medicamentos para reducir el dolor o bajar la fiebre. **No le dé aspirina.**

Creo que mi hijo tiene fiebre. ¿Qué debo hacer?

Tómele la temperatura para ver si tiene fiebre. Una manera fácil de hacerlo es tomar la temperatura en la axila con un termómetro electrónico (o use el método para tomar la temperatura que le recomiende su médico o enfermera). Estas son algunas cosas que puede hacer para ayudar a reducir la fiebre:

- Déle a su hijo mucho líquido para tomar.
- Vístalo con ropa ligera. No lo tape ni lo envuelva de manera ceñida.
- Déle un baño de esponja en unas pocas pulgadas de agua tibia (no fría).
- Déle un medicamento para bajar la fiebre o reducir el dolor según el peso del niño y las instrucciones de su profesional de la salud (vea la casilla abajo). **No le dé aspirina.** Vuelva a tomarle la temperatura después de 1 hora. Siga dándole el medicamento por 1 a 3 días, según sea necesario, siguiendo las instrucciones escritas abajo (si no hay nada escrito, siga las instrucciones de dosificación en el envase).

Mi hijo parece estar realmente enfermo. ¿Debo llamar al médico?

¡Si tiene **alguna inquietud** por la manera en que su hijo luce o se siente, llame a su profesional de la salud o al departamento de emergencia del hospital más cercano!

Profesional de la salud: llene la información a continuación:

Si la temperatura de su hijo es de _____ °F (°C) o más o si tiene alguna pregunta, llame a nuestra oficina.

Nuestro número de teléfono es: _____

Medicamento recomendado para bajar la fiebre o reducir el dolor:

Nombre y descripción del producto _____

Cantidad recomendada _____

Con cuánta frecuencia _____