

Vacunas para bebés y niños de 0 a 10 años de edad

Vacunar a su hijo de acuerdo al calendario de vacunación ayudará a protegerlo de las 15 enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Pregúntele al profesional de la salud de su hijo si está al día con todas las vacunas recomendadas.

Vacuna	¿Su hijo está al día?
Varicela (Var)	Su hijo necesita 2 dosis de la vacuna contra la varicela. La primera dosis se coloca entre los 12 y 15 meses y la segunda entre los 4 y 6 años de edad.
Difteria, tétanos, y tos ferina (pertussis; DTap)	Su hijo necesita 5 dosis de la vacuna DTaP. La primera dosis se coloca a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses, la cuarta entre los 15 y 18 meses y la quinta entre los 4 y 6 años de edad.
Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	Su hijo necesita 3 a 4 dosis de la vacuna Hib, dependiendo de qué marca de vacuna le coloquen. La primera dosis se coloca a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses (de ser necesario) y la última entre los 12 y 15 meses de edad.
Hepatitis A (HepA)	Su hijo necesita 2 dosis de la vacuna contra la hepatitis A. La primera dosis se coloca al año y la segunda entre 6 y 12 meses después de la primera dosis.
Hepatitis B (HepB)	Su hijo necesita 3 a 4 dosis de la vacuna contra la hepatitis B, dependiendo de qué marca de vacuna le coloquen. La primera dosis se coloca al nacer, la segunda entre 1 y 2 meses de edad, la tercera a los 4 meses (de ser necesario) y la última entre los 6 y 18 meses.
Influenza (gripe)	Todas las personas de 6 meses de edad y mayores deben colocarse la vacuna contra la influenza (gripe) todos los años, en otoño o invierno, por el resto de sus vidas. Algunos niños menores de 9 años de edad pueden necesitar 2 dosis. Pregúntele al profesional de la salud de su hijo si necesita más de 1 dosis.
Sarampión, paperas, rubéola (MMR)	Su hijo necesita 2 dosis de la vacuna MMR. La primera dosis se coloca entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda entre los 4 y 6 años de edad.
Meningocócica (MenACWY [MCV4], MenB)	Los bebés y niños de 0 a 10 años de edad con ciertas afecciones de salud (como por ejemplo si tienen un bazo que no funciona) se tienen que dar una o ambas vacunas contra el meningococo. Hable con su profesional de la salud para averiguar si su hijo necesita una vacuna meningocócica.
Neumocócica (Pneumovax [vacuna conjugada, PCV], Pnevumovax [vacuna polisacárida, PPSV])	Su hijo necesita 4 dosis de la vacuna Pnevumovax (PCV). La primera dosis se coloca a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses y la cuarta entre los 12 y 15 meses de edad. Algunos niños necesitan además una dosis de la vacuna Pnevumovax (PPSV). Pregúntele al profesional de la salud de su hijo si necesita esta protección adicional contra la enfermedad neumocócica.
Polio (IPV)	Su hijo necesita 4 dosis de la vacuna contra la poliomielitis (IPV). La primera dosis se coloca a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera entre los 6 y 18 meses y la cuarta entre los 4 y 6 años de edad.
Rotavirus (RV)	Su hijo necesita 2 a 3 dosis de la vacuna contra el rotavirus (RV), dependiendo de qué marca de vacuna le coloquen. La primera dosis se coloca a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, y la tercera a los 6 meses (de ser necesario).

¿Su hijo va a viajar fuera de los Estados Unidos? Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, o CDC) en wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list para información para viajeros, o consulte una clínica para viajeros.