

# 0-10세 영유아 및 아동의 백신 접종

귀 자녀가 때 맞춰 예방 접종을 받으면 백신으로 예방 가능한 15가지 질환으로부터 귀 자녀를 보호할 수 있습니다. 귀 자녀가 권장하는 모든 최신 백신 접종을 받았는지 담당 의료인에게 물어 보십시오.

백신	귀 자녀가 최신 백신 접종을 받았습니까?
<b>수두 (Var)</b>	귀 자녀는 2회 용량의 수두 백신을 투여해야 합니다. 첫 번째 용량은 12-15개월 차에 투여되고, 두 번째는 4-6세에 투여됩니다.
<b>디프테리아, 파상풍 및 백일 기침 (백일해, DTaP)</b>	귀 자녀는 5회 용량의 DTaP 백신을 투여해야 합니다. 첫 번째 용량은 2개월 차에, 두 번째는 4개월 차, 세 번째는 6개월 차, 네 번째는 15-18개월 차에, 그리고 다섯 번째는 4-6세에 투여합니다.
<b>헤모필루스 인플루엔자 b형(히브)</b>	귀 자녀는 백신 브랜드에 따라 3-4회 용량의 히브 백신을 투여해야 합니다. 첫 번째 용량은 2개월 차, 두 번째는 4개월 차, 세 번째는 6개월 차(필요한 경우)에, 그리고 마지막은 12-15개월 차에 투여됩니다.
<b>A형 간염 (HepA)</b>	귀 자녀는 2회 용량의 A형 간염 백신을 투여해야 합니다. 첫 번째 용량은 1세에, 그리고 두 번째는 6-12개월 이후에 투여됩니다.
<b>B형 간염 (HepB)</b>	귀 자녀는 백신 브랜드에 따라 3-4회 용량의 B형 간염 백신을 투여해야 합니다. 첫 번째 용량은 출생 시, 두 번째는 1-2개월 차, 세 번째는 4개월 차(필요한 경우)에, 그리고 마지막은 6-18개월 차에 투여됩니다.
<b>인플루엔자 (Flu)</b>	6개월 이상인 모든 아이는 가을이나 겨울에, 그리고 생애 나머지 기간 동안 인플루엔자 백신 접종을 받아야 합니다. 9세 미만의 몇몇 아동은 2회 용량을 투여해야 합니다. 귀 자녀가 1회 넘게 용량을 투여해야 하는지 귀 자녀의 담당 의료인에게 물어 보십시오.
<b>홍역, 볼거리, 풍진(MMR)</b>	귀 자녀는 2회 용량의 MMR 백신을 투여해야 합니다. 첫 번째 용량은 12-15개월 차에, 그리고 두 번째는 4-6세에 투여됩니다.
<b>수막구균 (MenACWY [MCV4], MenB)</b>	특정 건강 상태(예: 비장 기능 이상)의 0-10세 영아와 아동은 1 또는 2회의 수막구균 백신을 접종해야 합니다. 담당 의료인과 상의하여 귀 자녀에게 뇌막염 예방 접종이 필요한지 확인하십시오.
<b>폐렴구균 (프리베나[결합 백신, PCV], 뉴모박스[다당류 백신, PPSV])</b>	귀 자녀는 4회 용량의 프리베나(PCV) 백신을 투여해야 합니다. 2개월 차에 첫 번째 용량이 투여되고, 4개월 차에 두 번째, 6개월 차에 세 번째, 그리고 12-15개월 차에 네 번째 용량이 투여됩니다. 또한 몇몇 아동들은 뉴모박스(PPSV) 용량을 투여해야 할 수 있습니다. 귀 자녀가 폐렴구균 질환에 대한 추가 보호 조치가 필요한지 귀 자녀의 담당 의료인에게 물어 보십시오.
<b>폴리오 (IPV)</b>	귀 자녀는 4회 용량의 폴리오 백신(IPV)을 투여해야 합니다. 첫 번째 용량은 2개월 차에, 두 번째는 4개월 차, 세 번째는 6-18개월 차에, 그리고 네 번째는 4-6세에 투여합니다.
<b>로타바이러스 (RV)</b>	귀 자녀는 백신 브랜드에 따라 2-3회 용량의 로타바이러스 백신(RV)을 투여해야 합니다. 첫 번째 용량은 2개월 차에, 두 번째는 4개월 차에, 세 번째(필요한 경우)는 6개월 차에 투여합니다.

귀 자녀가 미국 밖으로 여행을 떠날 예정입니까? 질병예방관리 센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 웹사이트([wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list](http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list))를 방문하여 여행 정보를 참조하거나 여행 진료소 담당자와 상의하십시오.