

青春期前儿童和青少年(11岁-19岁)疫苗接种

进行免疫接种是一项终身持续、保护生命的工作。确保您的医疗护理提供者为您注射了所有截至目前为止应该注射的疫苗。检查以确保您已经接种了您所需的所有疫苗。

疫苗	您需要它吗?
水痘 (Var)	是的! 如果您还没有接种该疫苗, 还没有患过水痘, 那么您需要注射 2 剂疫苗。任何只接种了一剂疫苗的人应该注射第二剂。
甲肝 (HepA)	是的! 如果您想预防这种疾病, 或如果您有某种甲型肝炎的危险因素 (比如, 出国旅行), 那么您需要注射 2 剂甲型肝炎疫苗, 与您的医疗护理提供者一起进行核查, 查明您是否存在需要接种该疫苗的某种危险因素。
乙肝 (HepB)	是的! 建议对所有 0-18 岁的人使用这种疫苗。如果您还没有接受过乙肝疫苗系列, 那么您需要注射该系列疫苗。
乙型流感嗜血杆菌 (Hib)	也许。 如果您还没有接种过 Hib 疫苗, 而且您患有某种高风险的病症 (比如, 无功能性脾脏), 您需要该疫苗。
人乳头瘤病毒 (HPV)	是的! 所有年龄为 11 岁及以上的青春期前儿童和青少年需要注射系列 HPV 疫苗。该疫苗用于预防 HPV, 它是宫颈癌最常见的病因。它还可以预防其他一些类型的癌症, 比如, 肛门癌、阴茎癌和喉癌。HPV 疫苗也能预防生殖器疣。
流感 (Flu)	是的! 每个年龄在 6 个月及以上的人, 都需要在有生之年, 在每年秋天或冬天, 接种流感疫苗。
麻疹、腮腺炎、风疹 (MMR)	是的! 如果您还没有注射过 MMR 疫苗, 那么您需要注射 2 剂 MMR 疫苗。通常在儿童期注射 MMR 疫苗。
脑膜炎球菌 ACWY (MenACWY, MCV4)	是的! 所有青春期前的儿童和青少年都需要注射 2 剂 MenACWY 疫苗, 第一剂在 11-12 岁时注射, 第二剂在 16 岁时注射。如果您是一名生活在学生宿舍的大学一年级学生, 如果您从未注射过 MenACWY 疫苗或只在 16 岁前注射过该疫苗, 那么您需要注射一剂 MenACWY。向您的医疗护理提供者进行核实。
乙型脑膜炎球菌 (MenB)	是的! 建议想要预防乙型脑膜炎的青少年从 16 岁开始接受 2 剂 MenB 疫苗。患有特定风险疾病 (比如, 无功能性脾脏) 的青少年也应接种该疫苗。询问您的医疗护理提供者您是否有某种危险因素。
肺炎球菌 (Pneumovax, PPSV; Prevnar, PCV)	也许。 您有持续存在的健康问题吗? 如果是, 请向您的医疗护理提供者进行核实, 以查明您需要注射一种肺炎球菌疫苗, 还是两种肺炎球菌疫苗。
小儿麻痹症 (IPV)	是的! 如果您尚没有注射过脊髓灰质炎疫苗, 您需要注射至少 3 剂脊髓灰质炎系列疫苗。通常在儿童期注射脊髓灰质炎疫苗。
破伤风、白喉和百日咳 (Tdap)	是的! 所有青春期以前的儿童和青少年 (和成年人!) 都需要注射一剂 Tdap 疫苗 (一种预防破伤风、白喉和百日咳的疫苗)。在注射一剂 Tdap 后, 您需要每 10 年注射一剂破伤风-白喉 (Td) 疫苗。但是, 如果您怀孕了, 您就需要在每次怀孕期间再注射一剂 Tdap, 最好在孕晚期 (最后三个月) 注射。

您将去美国以外的地方旅游吗? 访问美国疾病控制和预防中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 网站 wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list, 获取旅行信息, 或咨询旅行诊所。

"Vaccinations for Preteens and Teens, Age 11-19 Years"