

# Khi Nào Trẻ Nhỏ và Thiếu Niên Cần Chủng Ngừa?

Tuổi	HepB Viêm Gan B	DTaP/Tdap Bạch hầu, uốn ván, ho gà	Hib Viêm màng não mủ do <i>Haemophilus influenza</i> tuýp b	IPV Bại liệt	PCV13 Phế cầu khuẩn liên hợp	RV Tiêu chảy cấp	MMR Sởi, quai bị, rubella	Varicella Thủy đậu	HepA Viêm gan A	HPV Siêu vi papilom ở người	Men- ACWY		MenB	Influenza Cúm
											Viêm màng não cầu khuẩn			
<b>Mới sinh</b> (trong vòng 24 giờ sau khi sinh)	✓													
<b>2 tháng</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
<b>4 tháng</b>	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓								
<b>6 tháng</b> (6–18 tháng)	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ (6–18 tháng)	✓	✓ <sup>1</sup>								✓ (6 tháng trở lên)
<b>12 tháng</b>			✓ (12–15 tháng)		✓ (12–15 tháng)		✓ (12–15 tháng)	✓ (12–15 tháng)	✓✓ (chủng 2 liều cách nhau 6 tháng khi 12–23 tháng)					
<b>15 tháng</b>		✓ <sup>2</sup> (15–18 tháng)												
<b>18 tháng</b>														
<b>19–23 tháng</b>														
<b>4–6 tuổi</b>		✓		✓			✓	✓						
<b>7–10 tuổi</b>														
<b>11–12 tuổi</b>		✓ (Tdap)								✓✓ <sup>3</sup>	✓			
<b>13–15 tuổi</b>														
<b>16–18 tuổi</b>											✓	✓✓ <sup>4,5</sup>		

Chủng một liều vào mùa thu hoặc mùa đông cho tất cả những người từ 6 tháng trở lên. Một số trẻ dưới 9 tuổi cần chủng 2 liều; hãy hỏi bác sĩ của con quý vị xem bé có cần chủng hơn 1 liều hay không.

**Khuyến khích tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên chích vắc-xin trị bệnh cúm hàng năm.**

## GHI CHÚ CUỐI TRANG

- Tùy theo loại vắc-xin mà bác sĩ sử dụng, con của quý vị có thể không cần đến liều này.
- Liều DTaP này có thể được chích sớm khi trẻ được 12 tháng tuổi nếu liều vắc-xin trước được chích cách đây 6 tháng.
- Trẻ đang trong một số tình trạng sức khỏe nhất định sẽ phải chích liều thứ ba.
- Loại vắc-xin này có thể được chích cho thiếu niên khỏe mạnh. Thiếu niên đang mắc một số bệnh nhất định cũng nên dùng loại vắc-xin này.
- Tùy theo ý kiến bác sĩ, con quý vị ở tuổi thiếu niên có thể cần chích liều bổ sung.