

VACCINATION CONTRE LA DIPHTERIE ET LE TETANOS (Td)

**Ce que vous devez
savoir avant de vous
faire vacciner ou de
faire vacciner votre
enfant**



U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
Centers for Disease Control and Prevention
National Immunization Program

A PROPOS DES MALADIES

Le tétanos et la diphtérie sont des maladies graves. Le tétanos est causé par une microbe qui s'introduit dans le corps par une

coupure ou une plaie. La diphtérie se transmet d'une personne infectée à une autre par le nez ou la gorge.

Le tétanos entraîne :

un raidissement douloureux des muscles du corps entier.

Il peut entraîner :

- un "blocage" de la mâchoire, le patient ne pouvant plus ouvrir la bouche ni avaler.

La diphtérie entraîne :

une inflammation du nez, de la gorge ou des voies respiratoires

Elle peut entraîner :

- des difficultés respiratoires
- une défaillance cardiaque
- une paralysie
- la mort

A PROPOS DES VACCINS

Les avantages des vaccins

La vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre le tétanos et la diphtérie. Grâce à la vaccination, ces maladies sont beaucoup plus rares. Ces maladies sont rares chez les enfants car la plupart d'entre eux reçoivent les vaccins suivants : DTP (diphtérie, tétanos, coqueluche), DTaP (diphtérie, tétanos et coqueluche acellulaire) ou DT (diphtérie et tétanos). Si la vaccination n'était plus pratiquée, de nombreux enfants contracteraient ces maladies.

Quand doit-on recevoir le vaccin Td ?

Le vaccin contre le tétanos et la diphtérie (Td) est prévu pour les personnes âgées de plus de 7 ans.

Les personnes n'ayant pas reçu un minimum de trois doses de vaccination contre le tétanos et la diphtérie (DTP, DTaP ou DT) au cours de leur vie doivent les recevoir par le vaccin Td. Après la troisième dose, un rappel est nécessaire tous les 10 ans.

D'autres vaccins peuvent être administrés en même temps que le Td.

Indiquez à votre médecin ou infirmière si la personne qui reçoit le vaccin :

- a déjà fait une réaction allergique grave ou tout autre problème du à la vaccination contre le tétanos et la diphtérie (DTP, DTaP ou DT)
- est actuellement atteinte d'une maladie sérieuse ou grave
- est enceinte

Si vous n'êtes pas sur(e), veuillez consulter votre médecin ou infirmière.

Quels sont les risques associés au vaccin Td ?

Comme avec tout médicament, il existe un risque très faible de réaction sérieuse pouvant parfois entraîner la mort après l'injection d'un vaccin.

Les risques dus à la vaccination sont beaucoup plus faibles que ceux encourus lors de la maladie elle-même si la vaccination n'était plus pratiquée.

Dans la plupart des cas, les personnes qui reçoivent la vaccination Td ne manifestent aucune réaction.

Problèmes bénins

En cas de réaction bénigne, les symptômes apparaissent dans les heures qui suivent l'injection, ou de 1 à 2 jours après. Ces symptômes peuvent durer de 1 à 2 jours.

- douleur, rougeur ou gonflement au site d'injection.

Ces problèmes peuvent être plus graves chez les personnes adultes qui reçoivent souvent le vaccin Td.

De l'acétaminophène ou de l'ibuprofène (sans aspirine) peuvent être administrés pour calmer la douleur.

Problèmes graves

Ces problèmes sont **très rares** :

- Réaction allergique grave
- Douleur aiguë et atrophie musculaire au niveau des épaules. Ces symptômes peuvent se déclarer dans les 2 jours qui suivent et jusqu'à 4 semaines après l'injection, et peuvent durer plusieurs mois.

Que faire en cas de réaction grave :

- ☞ Contactez un médecin ou emmenez immédiatement la personne chez un médecin.
- ☞ Notez ce qui c'est passé, ainsi que la date et l'heure.
- ☞ Demandez à votre médecin, à une infirmière ou au service santé de remplir un formulaire VAERS (rapport de réaction adverse à la vaccination) ou appelez :
1-800-822-7967 (appel gratuit)

Le programme national d'indemnisation en cas de réaction adverse à un vaccin apporte une aide financière à toute personne victime d'une réaction adverse provoquée par un vaccin. Pour obtenir des informations supplémentaires, téléphonez au :
1-800-338-2382 (appel gratuit)

Pour en savoir davantage, demandez à votre médecin ou infirmière de vous remettre un dépliant sur le vaccin ou de vous suggérer d'autres sources d'informations.

