

수두 백신

귀 하 께 서 아 서 야 할 사 항

1 왜 백신 접종을 해야 하나?

수두 (일명 작은마마)는 흔한 유년기 질병입니다. 이것은 대개 증상이 가볍지만, 특별히 어린 유아와 어른에는 심할 수 있습니다.

- 수두 바이러스는 공기나 수두 물집에서 나오는 진물에 접촉함으로써 사람 대 사람으로 전염될 수 있습니다.
- 발진, 가려움, 발열 및 피로를 일으킵니다.
- 심한 피부 염증, 자국, 폐렴, 뇌손상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
- 수두를 앓은 사람은 1년 후에 대상 포진이라고 하는 아픈 발진이 나타날 수 있습니다.
- 미국에서는 매년 약 12,000명이 수두로 인해 입원합니다.
- 미국에서는 매년 약 100명이 수두의 결과로써 사망합니다.

수두 백신은 수두를 예방합니다.

수두 백신을 접종하는 대부분의 사람들은 수두에 걸리지 않습니다. 만일 수두 백신을 접종했는데도 수두에 걸렸다면, 대개 매우 가볍게 앓습니다. 반점의 수도 적고 열이 날 가능성도 적으며 회복도 더 빨리 됩니다.

2 누가 수두 백신을 접종해야 하며 언제 해야 하나?

- ✓ 어린이들은 생후 12개월과 18개월 사이에 1회분의 수두 백신을 접종해야하고 만일 수두를 앓은 적이 전혀 없다면 그 이후의 나이에서는 아무 때나 접종해야 합니다.

13세 이상이 될 때까지 수두 백신을 접종하지 않은 사람은 4-8주 간격을 두고 2회분의 접종을 해야 합니다.

자세한 것은 의사나 간호원에게 문의하십시오.

수두 백신은 다른 백신과 동시에 접종해도 됩니다.

3 일부 사람들은 수두 백신을 맞지 말거나 기다려야 합니다

- 젤라틴, 네오마이신 항생제, 또는 (2차분의 접종이 필요한 사람들의 경우) 앞서 접종한 수두 백신에 대해 생명을 위협하는 알레르기 반응을 일으킨 적이 있는 사람은 또 다시 맞지 말아야 합니다.
- 예방 접종을하기로 예정된 때에 중간 정도나 심하게 앓는 사람은 대개 수두 백신을 접종하기 전에 건강을 회복할 때까지 기다려야 합니다.
- 임신부는 출산하고 날 때까지 기다렸다가 수두 백신을 접종해야 합니다. 여성들은 수두 백신을 접종하고 나서 1개월간은 임신하지 말아야 합니다.
- 다음과 같은 사람들을 포함한 일부 사람들은 수두 백신을 접종해야 하는지 의사에게 확인해야 합니다:
 - HIV/AIDS, 또는 면역 체계에 영향을 미치는 다른 질병을 가진 사람
 - 스테로이드와 같이 면역 체계에 영향을 미치는 약으로 2주 이상 치료를 받고 있는 사람
 - 어떤 종류든지 암에 걸린 사람
 - x선이나 약으로 암 치료를 받고 있는 사람
- 최근에 수혈을 했거나 다른 혈액 제품을 사용한 사람은 언제 수두 백신을 접종해도 되는지 의사에게 문의해야 합니다.

정보가 더 필요하다면 의사나 간호원에게 문의하십시오.

4

수두 백신이 야기할 수 있는 위험은 어떠한 것인가?

백신은 다른 약들처럼 심한 알레르기 반응과 같은 심각한 문제를 야기할 수 있습니다. 수두 백신이 심한 해를 입히거나 사망을 가져올 위험성은 극히 적습니다.

수두 백신을 접종하는 것이 수두에 걸리는 것보다 훨씬 더 안전합니다.

수두 백신을 접종한 대부분의 사람들이 이것으로 인한 아무 문제도 없습니다.

가벼운 문제

- 주사 맞은 자리의 통증이나 부어오름 (어린이는 5명 가운데 약 1명 그리고 청소년과 어른은 3명 가운데 1명)
- 발열 (10명 가운데 1명 미만)
- 가벼운 발진, 예방 접종 후 1개월 이내 (20명 가운데 약 1명 이하). 이러한 사람들이 집안 식구들에게 전염시킬 수 있는데, 그러나 매우 드뭅니다.

중간 정도의 문제

- 발열에 의한 발작 (경련 및 응시) (1,000명 가운데 1명 이하).

심한 문제

- 폐렴 (매우 드뭅)
- 심한 뇌 반응과 낮은 혈구수를 포함한 기타 심각한 문제들이 수두 백신 접종 후에 보고된 적이 있습니다. 이러한 문제들은 매우 드물게 발생하여 전문가들은 이러한 문제들이 백신에 의해 발생한 것인지 아닌지 확실히 알지 못합니다. 이러한 문제들은 설사 발생한다고 해도 매우 드뭅니다.

5

중간 정도나 심한 반응을 보이면 어떻게 하는가?

무엇을 살펴보아야 하는가?

심한 알레르기 반응, 고열 또는 행동 변화와 같이 보통 때와 다른 상태. 심한 알레르기 반응의 징후로는 접종 후 몇 분 내지 몇 시간 이내에 오는 호흡 곤란, 쉼 목소리나 천식 소리, 발진, 창백함, 기운 없음, 빠른 심장 박동, 또는 현기증이 포함됩니다. 만일 고열이나 발작이 발생한다면 그것은 접종한 지 1주 내지 6주 후일 것입니다.

어떻게 해야 하는가?

- 즉시 의사를 부르거나 환자를 의사에게 데려가십시오.
- 어떤 일이 발생했는지와, 발생한 일시, 그리고 언제 백신을 접종했는지를 의사에게 말하십시오.
- 의사, 간호원, 또는 보건국에 백신 사고 보고서(VAERS)를 제출하도록 부탁하거나 1-800-822-7967번으로 VAERS에 직접 전화하십시오.

6

국가 백신 상해 배상 프로그램

귀하나 귀하의 자녀가 백신에 대해 심한 반응을 일으키는 드문 경우에, 상해를 입은 사람의 진료비 지불을 돕기 위한 연방 프로그램이 제정되었습니다.

국가 백신 상해 프로그램에 관해 자세한 것을 알기 원하면 1-800-338-2382번으로 전화하거나 이 프로그램의 웹사이트인 <http://www.hrsa.gov/osp/vicp/> 를 방문하십시오

7

더 자세히 알려면 어떻게 해야 하는가?

- 의사나 간호원에게 문의하십시오. 백신 패키지에 포함된 설명서를 주거나 정보를 얻을 수 있는 다른 곳을 알려줄 것입니다.
- 거주지 지방 또는 주 정부 보건국의 면역 프로그램으로 전화하십시오.
- 질병 통제 및 예방 센터(CDC)에 연락하십시오:
 - Call 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)
 - 전국 면역 프로그램의 웹사이트 <http://www.cdc.gov/nip>를 방문하십시오



U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
Centers for Disease Control and Prevention
National Immunization Program

Vaccine Information Statement
Varicella IMM-494ML-Korean (12/16/98) 42 U.S.C. § 300aa-26