

Vaccinations pour les nourrissons et enfants, âgés de 0 à 10 ans

Faire vacciner votre enfant à temps aidera à le/la protéger contre 15 maladies évitables par la vaccination. Demandez au prestataire de soins de votre enfant si votre enfant est à jour de tous les vaccins recommandés.

Vaccin	Votre enfant est-il/elle à jour ?
Varicelle (Var)	Votre enfant a besoin de recevoir 2 doses de vaccin contre la varicelle. La première dose est administrée entre 12 et 15 mois, et la seconde entre 4 et 6 ans.
Diphtérie, tétanos et coqueluche (DTC)	Votre enfant a besoin de recevoir 5 doses de vaccin DTC. La première dose est administrée à 2 mois, la seconde à 4 mois, la troisième à 6 mois, la quatrième entre 15 et 18 mois, et la cinquième entre 4 et 6 ans.
Haemophilus influenzae de type B (Hib)	Votre enfant a besoin de recevoir 3 à 4 doses de vaccin contre le Hib, selon la marque du vaccin. La première dose est administrée à 2 mois, la seconde à 4 mois, la troisième à 6 mois (si nécessaire), et la dernière entre 12 et 15 mois.
Hépatite A (HepA)	Votre enfant a besoin de recevoir 2 doses de vaccin contre l'hépatite A. La première dose est administrée à l'âge de 1 an et la deuxième 6 à 12 mois plus tard.
Hépatite B (HepB)	Votre enfant a besoin de recevoir 3 à 4 doses de vaccin contre l'hépatite B, selon la marque du vaccin. La première dose est administrée à la naissance, la seconde entre 1 et 2 mois, la troisième à 4 mois (si nécessaire), et la dernière entre 6 et 18 mois.
Grippe	Toutes les personnes âgées de 6 mois et plus doivent se faire vacciner contre la grippe chaque automne ou hiver, et pendant le reste de leur vie. Certains enfants de moins de 9 ans ont besoin de recevoir 2 doses. Demandez au prestataire de soins de votre enfant si votre enfant a besoin de recevoir plus de 1 dose.
Rougeole, oreillons et rubéole (ROR)	Votre enfant a besoin de recevoir 2 doses de vaccin ROR. La première dose est administrée entre 12 et 15 mois, et la seconde entre 4 et 6 ans.
Méningocoque (MenACWY [MCV4], MenB)	Les nourrissons et les enfants âgés de 0 à 10 ans ayant certains problèmes de santé (comme une rate non fonctionnelle) ont besoin de recevoir l'un des deux vaccins antiméningococciques ou les deux. Discutez avec votre prestataire de soins pour savoir si votre enfant doit recevoir un vaccin contre le méningocoque.
Pneumocoque (Pneumar [vaccin conjugué, PCV], Pneumovax [vaccin polysaccharidique, PPSV])	Votre enfant a besoin de recevoir 4 doses de Pnevmar (PCV). La première dose est administrée à 2 mois, la seconde à 4 mois, la troisième à 6 mois et la quatrième entre 12 et 15 mois. Certains enfants ont également besoin de recevoir une dose de Pneumovax (PPSV). Demandez au prestataire de soins de votre enfant si votre enfant a besoin de recevoir cette protection supplémentaire contre la maladie pneumococcique.
Polio (VPI)	Votre enfant a besoin de recevoir 4 doses de vaccin contre la polio (VPI). La première dose est administrée à 2 mois, la seconde à 4 mois, la troisième entre 6 et 18 mois, et la quatrième entre 4 et 6 ans.
Rotavirus (RV)	Votre enfant a besoin de recevoir 2 à 3 doses de vaccin contre le rotavirus (RV), selon la marque du vaccin. La première dose est administrée à 2 mois, la seconde à 4 mois, et la troisième (si nécessaire) à 6 mois.

Votre enfant va-t-il/elle voyager en dehors des États-Unis ? Visitez le site Web des Centres de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list, pour obtenir des informations destinées aux voyageurs, ou adressez-vous à une clinique pour les voyageurs.