

# 성인 백신 접종

## 백신 접종을 받기에 결코 늦지 않은 나이입니다!

백신 접종은 평생 동안 생명을 지키는 일입니다. 필요한 모든 백신 접종을 받았는지 담당 의료인에게 꼭 확인하십시오.

백신	백신이 필요할까요?
<b>A형 간염</b> (HepA)	<b>그럴 수도 있습니다.</b> A형 간염*에 대한 특정 위험 요인이 있거나 단지 이 질환에 걸리는 것을 원치 않는 경우 이 백신 접종을 받아야 합니다. 이 백신은 대개 6-12개월 간격에 2회 용량으로 투여됩니다.
<b>B형 간염</b> (HepB)	<b>그럴 수도 있습니다.</b> B형 간염*에 대한 특정 위험 요인이 있거나 단지 이 질환에 걸리는 것을 원치 않는 경우 이 백신 접종을 받아야 합니다. 백신은 브랜드에 따라 2회 또는 3회 용량으로 접종합니다.
<b>히브 (해모필루스 인플루엔자 b형)</b>	<b>그럴 수도 있습니다.</b> 예를 들어, 비장 기능 부전과 같은 특정 고위험 상태의 일부 성인은 히브 백신 접종을 받아야 합니다. 담당 의료인과 상의하여 이 백신이 필요한지 알아보십시오.
<b>인유두종 바이러스</b> (HPV)	<b>예!</b> 귀하가 26세 이하의 여성이거나 21세 이하의 남성인 경우 이 백신 접종이 필요합니다. 위험 상태*의 22 ~ 26세 남성 또한 백신 접종이 필요합니다. HPV를 예방하고자 하는 22 ~ 26세의 모든 다른 남성들도 또한 이 백신을 접종받을 수 있습니다. 해당 백신은 대개 6개월에 걸쳐 3회 용량으로 투여됩니다.
<b>인플루엔자</b>	<b>예!</b> 귀하 본인의 예방과 귀하 주변에 있는 다른 사람들의 예방을 위해 가을(또는 겨울)이 될 때마다 1회 용량을 투여해야 합니다.
<b>홍역, 볼거리, 풍진</b> (MMR)	<b>그럴 수도 있습니다.</b> 1957년 또는 그 이후에 태어난 경우 적어도 1회 용량의 MMR 백신 접종을 받아야 합니다. 두 번째 용량을 투여해야 할 수도 있습니다.*
<b>수막구균 ACWY</b> (MenACWY)	<b>그럴 수도 있습니다.</b> 예를 들어, 비장 기능 부전과 같은 여러 건강 문제* 중 하나가 있다면 MenACWY 백신 접종을 받아야 할 수 있습니다. 귀하가 21세 이하이고, 기숙사에 거주하는 대학 1학년생이고, 이전에 한 번도 백신 접종을 받지 않았거나 16세가 되기 전에 접종을 받은 경우 MenACWY 백신 접종이 필요할 수 있습니다.
<b>수막구균 B</b> (MenB)	<b>그럴 수도 있습니다.</b> 귀하가 23세 이하인 경우(심지어 고위험 질병이 없더라도) MenB 백신을 고려해야 합니다. 예를 들어, 비장 기능 부전과 같은 여러 건강 문제* 중 하나가 있다면 MenB 백신 접종을 받아야 합니다.
<b>폐렴구균</b> (뉴모박스 23, PPSV23; 프리베나 13, PCV13)	<b>예!</b> 65세(또는 그 이상)인 경우, 폐렴구균 백신인 프리베나(전에 접종을 받지 않은 경우)와 뉴모박스를 모두 접종해야 합니다. 먼저 프리베나를 접종하고, 그 다음 1년 후에 뉴모박스를 접종해야 합니다. 65세 이하이고 특정 고위험 상태(예: 천식, 심장, 폐 또는 신장 질환, 면역억제 또는 비장 기능 부전 또는 흡연자)인 경우,* 하나 또는 두 개의 백신 접종을 받아야 합니다. 담당 의료인과 상의하여 언제 이 접종이 필요한지 알아보십시오.*
<b>파상풍, 디프테리아 및 백일 기침(백일해)</b> (Tdap, Td)	<b>예!</b> 평생 동안 Tdap 접종을 받지 않은 경우, 지금 Tdap 주사(성인 백일 기침 백신)를 맞아야 합니다. 그리고 모든 여성은 매 임신 중에 1회 접종을 받아야 합니다. 그 이후에는, 10년마다 Td 추가 접종을 받아야 합니다. 여러분의 생애에서 언젠가 적어도 3회의 파상풍 및 디프테리아독소이드 함유 주사를 맞지 않았거나, 깊은 상처나 더러운 상처가 있는 경우 담당 의료인과 상의하십시오.
<b>수두</b>	<b>그럴 수도 있습니다.</b> 수두를 앓은 적이 없고, 백신 접종을 받은 적이 없거나, 백신 접종을 받았지만 1회 용량만 투여했다면, 담당 의료인과 상의하여 이 백신 접종이 필요한지 확인하십시오.*
<b>포진 (대상 포진)</b>	<b>예!</b> 50세 이상인 경우, 조스타박스 백신을 접종받은 경우에도 싱그릭스 브랜드의 대상포진 백신을 2회 용량으로 연속해서 접종받아야 합니다.

\* 담당 의료인과 상의하여 감염 위험 수준과 이 백신에 대한 필요성을 결정하십시오.

**미국 밖으로 여행을 떠날 예정이십니까?** 질병예방관리 센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 웹사이트([wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list](http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list))를 방문하여 여행 정보를 참조하거나 여행 진료소 담당자와 상의하십시오.