

À quel âge les enfants et les adolescents ont-ils besoin d'être vaccinés ?

Âge	HepB Hépatite B	DTC/Tdap Diphtérie, tétanos, coqueluche	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> de type B	VPI Polio	VCP13 Vaccin conjugué anti- pneumococcique	RV Rotavirus	ROR Rougeole, oreillons et rubéole	Varicelle	HepA Hépatite A	VPH Virus du papillome humain	Men		Grippe
											ACWY	MenB	
À la naissance (dans les 24 heures suivant la naissance)	✓												
2 mois	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
4 mois	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓							
6 mois	✓ (6-18 mois)	✓	✓ ¹	✓ (6-18 mois)	✓	✓ ¹							✓ (6 mois et plus)
12 mois			✓ (12-15 mois)		✓ (12-15 mois)		✓ (12-15 mois)	✓ (12-15 mois)	✓✓ (2 doses administrées à 6 mois d'intervalle entre 12 et 23 mois)				
15 mois		✓ ² (15-18 mois)											
18 mois													
19-23 mois													
4-6 ans		✓		✓			✓	✓					
7-10 ans													
11-12 ans		✓ (Tdap)								✓✓ ³	✓		
13-15 ans													
16-18 ans											✓	✓✓ ^{4,5}	

Une dose chaque automne ou hiver pour toutes les personnes âgées de 6 mois et plus. Certains enfants de moins de 9 ans ont besoin de 2 doses ; demandez au prestataire de soins de votre enfant si votre enfant a besoin de recevoir plus de 1 dose.

Le vaccin antigrippal est recommandé chaque année pour les personnes âgées de 6 mois et plus.



“When Do Children and Teens Need Vaccinations?”
 Saint Paul, Minnesota • 651-647-9009 • www.immunize.org • www.vaccineinformation.org
www.immunize.org/catg.d/p4050-10.pdf • Item #P4050-10 French (6/17)

NOTES EXPLICATIVES

- 1 Votre enfant pourrait ne pas avoir besoin de recevoir cette dose, selon le type de vaccin que votre prestataire de soins utilise.
- 2 Cette dose de DTC peut être administrée dès l'âge de 12 mois si 6 mois se sont écoulés depuis la dose précédente.
- 3 Les enfants ayant certains problèmes de santé auront besoin de recevoir une troisième dose.
- 4 Ce vaccin peut être administré à des adolescents en bonne santé. Il est également recommandé aux adolescents ayant certains problèmes de santé.
- 5 Votre adolescent peut avoir besoin de recevoir une dose supplémentaire selon la recommandation de votre prestataire de soins.