

# Chủng ngừa cho trẻ sơ sinh

## Hướng dẫn dành cho cha mẹ

Dưới đây là những loại vắc-xin mà con quý vị cần!

Khi sinh <sup>1,2</sup>	HepB	RSV-mAb <sup>1</sup> 0-7 tháng													
2 tháng <sup>1,2</sup>	HepB 1-2 tháng <sup>2</sup>	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Bại liệt	+	RV				
4 tháng <sup>1,2</sup>	HepB <sup>3</sup>	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Bại liệt	+	RV				
6 tháng <sup>1,2</sup>	HepB 6-18 tháng <sup>2</sup>	+	DTaP	+	PCV	+	Hib <sup>4</sup>	+	Bại liệt 6-18 tháng <sup>2</sup>	+	RV <sup>5</sup>	+	Influenza (Cúm) <sup>6</sup>	+	COVID <sup>7</sup>
12 tháng tuổi trở lên <sup>1,2</sup>	MMR	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Thủy đậu	+	HepA <sup>8</sup>	+	Influenza (Cúm) <sup>6</sup>		
	12-15 tháng <sup>2</sup>		15-18 tháng <sup>2</sup>		12-15 tháng <sup>2</sup>		12-15 tháng <sup>2</sup>		12-15 tháng <sup>2</sup>		12-23 tháng <sup>2</sup>				

Kiểm tra với bác sĩ hoặc y tá của quý vị để đảm bảo con quý vị được chích tất cả các loại vắc-xin đúng lịch. Trong nhiều trường hợp, các loại vắc-xin được kết hợp để giảm số lần chích. Hãy nhớ yêu cầu một thẻ ghi chép với ngày chủng ngừa của con quý vị; mang theo thẻ này mỗi lần thăm khám.

Dưới đây là danh sách các bệnh mà con quý vị sẽ được bảo vệ:

**HepB:** viêm gan B, một bệnh gan nghiêm trọng

**DTaP:** bạch hầu, uốn ván và ho gà

**PCV:** vắc-xin liên hợp phế cầu khuẩn bảo vệ chống lại một bệnh nhiễm trùng máu, phổi và não nghiêm trọng

**Hib:** *Haemophilus influenzae* loại b, một bệnh nhiễm trùng não, họng và máu nghiêm trọng

**Bại liệt:** bại liệt, một bệnh tê liệt nghiêm trọng

**RSV:** vi-rút hợp bào hô hấp, nhiễm trùng phổi nghiêm trọng

**RV:** nhiễm vi-rút rota, một bệnh tiêu chảy nghiêm trọng

**Cúm:** bệnh nhiễm trùng phổi nghiêm trọng

**MMR:** sởi, quai bị và rubella

**COVID-19:** một bệnh nghiêm trọng và có khả năng lây nhiễm cao

**HepA:** viêm gan A, một bệnh gan nghiêm trọng

**Thủy đậu:** còn được gọi là trái rạ

### Lưu ý về bảng trên:

- Từ tháng 10 đến tháng 3, trẻ sơ sinh từ khi sinh đến 7 tháng tuổi có thể cần kháng thể phòng ngừa RSV (RSV-mAb) nếu không được tiêm vắc-xin RSV trong thời kỳ mang thai. Một số trẻ lớn hơn từ 8 đến 19 tháng tuổi có thể cần RSV-mAb trong mùa RSV thứ hai.
- Đây là độ tuổi nên chích vắc-xin này.
- Con quý vị có thể không cần chích vắc-xin HepB lúc 4 tháng tuổi, tùy theo loại vắc-xin được sử dụng. Hãy kiểm tra với bác sĩ hoặc y tá của quý vị.
- Con quý vị có thể không cần chích vắc-xin Hib lúc 6 tháng tuổi, tùy theo loại vắc-xin được sử dụng. Hãy kiểm tra với bác sĩ hoặc y tá của quý vị.
- Con quý vị có thể không cần chích vắc-xin RV lúc 6 tháng tuổi, tùy theo loại vắc-xin được sử dụng. Hãy kiểm tra với bác sĩ hoặc y tá của quý vị.
- Tất cả trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên cần được chích vắc-xin cúm vào mùa thu hoặc mùa đông hằng năm.
- Con quý vị sẽ cần chích 2 hoặc 3 liều, tùy theo nhãn hiệu vắc-xin ngừa COVID-19 được sử dụng.
- Con quý vị sẽ cần chích 2 liều vắc-xin HepA, cách nhau ít nhất 6 tháng.

