

# 青春期前儿童和少年的疫苗接种

进行免疫接种是一项终身持续、保护生命的事情。请确保您的医务人员为您注射了截至目前为止应该注射的疫苗。检查以确保您已经接种了您所需的所有疫苗。

疫苗	您需要接种吗？
水痘 (Varicella)	<b>是的！</b> 通常在儿童期注射水痘疫苗。如果您还没有接种该疫苗，还没有患过水痘，那么您需要注射2剂疫苗。
新冠肺炎 (COVID-19)	<b>是的！</b> 即使您过去已患过新冠肺炎，您也需要接种疫苗。您现在需要接种的疫苗类型取决于最新的CDC建议。
甲型肝炎 (HepA)	<b>是的！</b> 建议对所有1-18岁的人接种甲肝疫苗。HepA（甲肝）系列通常在儿童早期接种。如果您开始了一个接种系列，但没有完成，您可以从您没完成的剂次开始补种。
乙型肝炎 (HepB)	<b>是的！</b> 建议对所有0-18岁的人接种乙肝疫苗。HepB（乙肝）系列通常在婴儿期接种。如果您开始了一个接种系列，但没有完成，您可以从您没完成的剂次开始补种。
乙型流感嗜血杆菌 (Hib)	<b>也许。</b> 如果您还没有接种过Hib疫苗，且患有某种高风险的病症（例如：无功能性脾脏），那么您需要接种该疫苗。
人乳头瘤病毒 (HPV)	<b>是的！</b> HPV疫苗通常在青春期前儿童11岁或12岁时进行接种，但可提前至9岁时开始接种。未接种疫苗的年龄较大的青少年将需要接种2剂或3剂。这种疫苗可预防HPV，而HPV是几种癌症的常见成因。
流感病毒（流感）	<b>是的！</b> 为了保持健康和活跃，在您的一生中，每年秋天或冬天都需要接种流感病毒疫苗。
麻疹、腮腺炎、风疹 (MMR)	<b>是的！</b> 通常在儿童早期接种MMR疫苗。如果您还没有接种过MMR疫苗，那么您需要注射2剂MMR疫苗。
脑膜炎球菌ACWY (MenACWY、 MenABCWY)	<b>是的！</b> 所有青春期前的儿童和少年都需要注射2剂MenACWY疫苗，第一剂在11-12岁时注射，第二剂在16岁时注射。如果您是一名集体住宿的大学新生，如果您从未注射过MenACWY疫苗或只在16岁前注射过该疫苗，那么您需要注射一剂MenACWY。如果您有持续的高风险健康状况，您还需要接种加强剂。询问您的医疗护理提供者您是否有某种危险因素。当需要接种MenACWY和MenB疫苗时，可选择接种联合疫苗MenABCWY。
脑膜炎球菌B (MenB、 MenABCWY)	<b>是的！</b> 想要预防乙型脑膜炎的青少年应该从16岁开始接受2剂MenB疫苗。患有某些风险疾病的学龄前儿童和青少年也应接种疫苗，如果其风险持续存在，则需要接种加强针。询问您的医疗护理提供者您是否有某种危险因素。当需要接种MenACWY和MenB疫苗时，可选择接种联合疫苗MenABCWY。
肺炎球菌	<b>也许。</b> 您是否有持续的健康不良状况？如果有，请向您的医务人员进行核实，以确定您需要注射一种肺炎球菌疫苗，还是两种肺炎球菌疫苗。
小儿麻痹症 (IPV)	<b>是的！</b> 通常在儿童早期注射脊髓灰质炎疫苗。如果您尚未注射过脊髓灰质炎疫苗，您需要注射至少3剂脊髓灰质炎系列疫苗。
呼吸道合胞病毒 (RSV)	<b>也许。</b> 如果您怀孕了，为了保护您的孩子免受RSV感染，您应该接种Abrysvo（Pfizer）疫苗，或者婴儿应该接种RSV预防性抗体（Sanofi提供的Beyfortus）。
破伤风、 白喉和百日咳 (Tdap；Td)	<b>是的！</b> 所有青少年都需要接种百白破疫苗，这种疫苗可以预防破伤风、白喉和百日咳（Tdap）。在注射一剂Tdap后，您需要每10年注射一剂Tdap或破伤风-白喉（Td）疫苗。如果您怀孕，您将需要在每次妊娠期间，最好是在妊娠晚期再次注射Tdap。

您将去美国以外的地方旅游吗？Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 美国疾病控制与预防中心) 网站 [wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list](http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list), 获取旅行信息，或者咨询旅行诊所。

