

ਟੀਕਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਆਨ

RSV (ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੰਸੀਟੀਅਲ ਵਾਇਰਸ, Respiratory Syncytial Virus) ਟੀਕਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਦੇਖੋ www.immunize.org/vis

Hojas de información sobre vacunas están disponibles en español y en muchos otros idiomas. Visite www.immunize.org/vis

1. ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਉ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ?

RSV ਟੀਕਾ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੰਸੀਟੀਅਲ ਵਾਇਰਸ (RSV) ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਬਮਿਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। RSV ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ, ਠੰਡੇ-ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

RSV ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਮਿਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- RSV ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ) ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਨਿੰਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਜਾਂ ਦਲਿ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਮਿਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ RSV ਬਮਿਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- RSV ਸੰਕਰਮਣ ਕੁਝ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ RSV ਬਮਿਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਲਿ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਮਿਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

RSV ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸਿ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੰਘ ਜਾਂ ਛਕਿ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਸਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਸਿ ਸਤਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨੋਕ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਹਿਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ।

RSV ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਨੱਕ, ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਖੰਘ, ਛਕਿ, ਬੁਖਾਰ, ਜਾਂ ਘਰਘਰਾਹਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, RSV ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਿਚੜਿਪਨ (ਚੜਾਈ), ਘਟੀ ਹੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਜਾਂ ਐਪਨੀਆ (10 ਸਕਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ RSV ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। RSV ਬਰੋਨਕੋਓਲਾਈਟਿਸ (ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼) ਅਤੇ ਨਿਮੋਨੀਆ (ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। RSV ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਮਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਅਬਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲਮੋਨਰੀ ਬਮਿਾਰੀ (ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਮਿਾਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਜਾਂ ਦਲਿ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ (ਜਦੋਂ ਦਲਿ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੂਨ ਅਤੇ

ਆਕਸੀਜਨ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ) ਦੇ ਵਗਿੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

RSV ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਮਿਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2. RSV ਟੀਕਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ RSV ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਦੋ ਵਕਿਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਗਰਭਵਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਿਫ਼ ਇੱਕ ਵਕਿਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

CDC ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ 32 ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ 36 ਤੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ RSV ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਫ਼ਿਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ RSV ਬਮਿਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਫ਼ਿਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਖੇਤਰ, ਹਵਾਈ, ਅਲਾਸਕਾ, ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ), ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ RSV ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

CDC 75 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਜੋ ਗੰਭੀਰ RSV ਬਮਿਾਰੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹਨ ਲਈ RSV ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਫ਼ਿਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 60 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਜੋ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਲਿ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਮਿਾਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਹਿੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ।

RSV ਟੀਕਾ ਦੂਜੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



U.S. CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

3. ਆਪਣੇ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇਕਰ ਵਾਇਕਤੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ:

• **RSV ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਛਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ** ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਐਲਰਜੀ ਹੈ

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ RSV ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮੂਲੀ ਬਮਿਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਕਾਮ, ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਮਿਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ RSV ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਜੋਖਮ

• RSV ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ, ਅਤੇ ਸੋਜ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਟ ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ (ਥਕਾਨ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ), ਬੁਖਾਰ, ਸਹਿਤ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ, ਦਸਤ, ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

RSV ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਇਲੇਨ-ਬੈਰੇ ਸਿੰਡਰੋਮ (Guillain-Barré syndrome, GBS) ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਤੰਤੂ ਵਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, RSV ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਇਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ GBS ਦੇ ਵਧੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

RSV ਟੀਕਾਕਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭਵਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਪਸੀਆ ਸਮੇਤ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਕਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

V-Safe ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ CDC ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਿਭਰ, RSV ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ vsafe.cdc.gov 'ਤੇ V-Safe ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Punjabi translation of RSV Vaccine provided by California Department of Public Health, Immunization Program

ਟੀਕਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਆਨ

RSV ਟੀਕਾ

5. ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਕਤੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ (ਛਪਾਕੀ, ਚਹਿਰੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ) ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ **9-1-1** 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਇਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।

ਹੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਜਾਨਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਐਡਵਰਸ ਇਵੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। VAERS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.vaers.hhs.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ **1-800-822-7967** 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। VAERS ਸਰਿਫ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ VAERS ਸਟਾਫ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

6. ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

- ਆਪਣੇ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
- ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਭਿਗ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
- ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਪੈਕੇਜ ਇਨਸਰਟਸ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (FDA) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
 - **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)** 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
 - CDC ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.cdc.gov/vaccines 'ਤੇ ਜਾਓ।

10/17/2024 Punjabi

ਸਿਰਫ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

